

สมุนไพรในวรรณคดี ....

## จำปาเทศ

วงศ์เสถียรย์ ฉั่วกุล

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



...กระดังงาจำปาเทศ

เหมือนเสด็จแดนสวรรค์

อินทราและเทวัญ

ทุกข้อขั้วมาชื่นชม

ภาพย่เหเรือตอนเห่ชมดอกไม้  
ประพันธ์โดย..นายฉันท ขำวิไล

ชื่ออื่นๆ	ขนาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชลบุรี) ห่าอาว (หนองคาย) จำปีแขก (ภาคกลาง) สนาน (นนทบุรี) เหมือนคน (กาญจนบุรี) กะหนาย, ยวนปลา (ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Pterospermum littorale</i> Craib var. <i>littorale</i>
วงศ์	MALVACEAE (STERCULIACEAE)

**จำปาเทศ** เป็นไม้ต้น สูง 5 - 15 ม. ผิวใบมีขนแล้วเปลี่ยนเป็นเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ แปลงรูปได้ รูปใบฝ่ามือเมื่อเป็นใบอ่อนถึงเป็นรูปกลม เปลี่ยนเป็นรูปไข่เมื่อเป็นใบแก่ กว้าง 4 - 6.5 ซม. ยาว 8 - 16 ซม. ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเบี้ยวหรือมน มีขนและมีนวลที่ผิวใบด้านล่าง ขอบใบเป็นพู่หรือเรียบ เส้นใบมีความหนาเป็นชั้นคล้ายชั้นบันไดเห็นเด่นชัดที่ผิวใบด้านล่าง ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก มีขนทั้งสองด้าน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวถึงเหลือง มีขนทั้งสองด้าน ผลแห้งแตก รูปไข่ แข็ง กว้าง 3.5 - 5 ซม. ยาว 5.5 - 7 ซม. แยกเป็นห้าพูตามยาว เป็นคลื่นเป็นเหลี่ยม เดิมมีขนแล้วเปลี่ยนเป็นเกลี้ยง ผลมีวงกลีบเลี้ยงติดทน ร่วงง่าย เมล็ดจำนวนมาก รูปไข่ ปลายเมล็ดมีปีกบาง ขนาด 0.5 x 2 ซม.

**การกระจายพันธุ์** พืชถิ่นเดียวของไทย พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้

**นิเวศวิทยา** ป่าผลัดใบผสม ป่าเบญจพรรณ ขึ้นตามป่าละเมาะชายหาด ป่าชายหาด หรือตามร่องน้ำลำคลองที่ไม้ห่างจากฝั่งทะเล พบที่ความสูง 100 - 1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล

**ระยะเวลาออกดอกและติดผล** ดอก ตุลาคม - ธันวาคม ผล พฤศจิกายน - มีนาคม

**ประโยชน์** เปลือกต้น ใช้แก้ไข้

## เอกสารอ้างอิง

Phengklae C. Sterculiaceae. In; Santisuk T, Larsen K, eds. Flora of Thailand, Volume seven Part three. Bangkok: Prachachon Co. Ltd., 2001:539-654.