

ตำรับยาหอมหวาโกฐและยาหอมอินทจักร์

พมม๑๗ สุภกรเจริ-หนก

ตำรับยาหอมหวาโกฐและยาหอมอินทจักร์ เป็นตำรับยาในยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (1) และตำรับยาหอมหวาโกฐ ยังจัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549) กลุ่มบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม โดยเป็นยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แกลม) (2)

ตำรับยาหอมหวาโกฐ

ส่วนประกอบเครื่องยา (พืชวัตถุ 54 ชนิด ธาตุวัตถุ 1 ชนิด)

1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลำพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 ส่วน
2. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาตักแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 ส่วน
3. เปลือกสมุลแว้ง หนุ้าตีนนก แฝกหอม เปลือกชะลูด เปราะหอม รากไคร้เครือ เนื้อไม้ขอนดอก หนักสิ่งละ 4 ส่วน
4. ชิงแห้ง ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง สะค่าน ช้าพลู หนักสิ่งละ 3 ส่วน
5. หัวหมู ลูกกระวาน กานพลู ดอกจันทร์ ลูกจันทร์ อบเชยญวน ลูกผักชีลา แก่นสน หนักสิ่งละ 4 ส่วน
6. สักชี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ จันทน์เทศ จันทน์แดง ลูกกระดอม บอระเพ็ด หนักสิ่งละ 4 ส่วน
7. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ กระลำพัก หนักสิ่งละ 4 ส่วน
8. เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก ชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 4 ส่วน
9. พิมเสน หนัก 1 ส่วน

รูปแบบยา

ยาผง ยาเม็ด (200 มก./เม็ด)

ข้อบ่งใช้

แกลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ แกลมปลายไข้ (หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด อ่อนเพลีย)

3

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง: ครึ่งละ 1 - 2 ช้อนชา ละลายน้ำกระสาย 2 - 4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชม. เมื่อมีอาการวันละไม่เกิน 3 ครั้ง

ชนิดเม็ด: ครึ่งละ 5 - 10 เม็ด ละลายน้ำกระสาย 2 - 4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชม. เมื่อมีอาการวันละไม่เกิน 3 ครั้ง

ข้อควรระวัง

ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ และการใช้ในหญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

ตำรับจากสมุนไพร

ส่วนประกอบเครื่องยา (พีชวัตถุ 44 ชนิด สัตว์วัตถุ 4 ชนิด ธาตุวัตถุ 1 ชนิด)

1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลำพา โกฐกระดุก โกฐก้านพร้าว
โกฐพุงปลา โกฐน้ำเต้า หนักสิ่งละ 1 ส่วน
2. เทียนดำ เทียนขาว เทียนแดง เทียนขาวเปลือก เทียนยาวพาดิน หนักสิ่งละ 1 ส่วน
3. เปลือกสมุลแว้ง กฤษณา รากไคร้เครือ เนื้อไม้ขอนดอก หนักสิ่งละ 1 ส่วน
4. สะค้าน รากข้าวปลู ชิง ดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง หนักสิ่งละ 1 ส่วน
5. ลูกกระวาน กานพลู ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกผักชีลา หนักสิ่งละ 1 ส่วน
6. จันทน์เทศ จันทน์แดง ลูกกระดอม บอระเพ็ด หนักสิ่งละ 1 ส่วน
7. ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกสารภี ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกคำไทย
กระลำพัก หนักสิ่งละ 1 ส่วน
8. เถามวกขาว รากย่านาง ลำพันแดง ฝางเสน หนักสิ่งละ 1 ส่วน
9. ดีงูเห่า ดีหมูป่า ดีวัว กายาน ชะมดเซ็ด หนักสิ่งละ 1 ส่วน

รูปแบบยา

ยาผง ยาเม็ด (200 มก./เม็ด)

ข้อบ่งใช้

แก้ลมบาดทะจิต แก้กลิ้นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง ครั้งละ □ - 1 ช้อนชา ละลายน้ำกระสาย 2 - 4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชม. เมื่อมีอาการ วันละไม่เกิน 3 ครั้ง

ชนิดเม็ด ครั้งละ 5 - 10 เม็ด ละลายน้ำกระสาย 2 - 4 ช้อนโต๊ะ ทุก 3 ชม. เมื่อมีอาการ วันละไม่เกิน 3 ครั้ง

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของเครื่องยาและสารสกัดตำรับยาหอม หวโกฐและยาหอมอินทจักร์

ข้อมูลจากการสืบค้นทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของเครื่องยาที่เป็นส่วนประกอบในตำรับยาหอมทั้งสองตำรับ พบว่าเครื่องยาเหล่านี้มีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเครื่องยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จะมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ได้แก่ กระเทียม (3 - 6) กฤษณา (7) ชะเอมเทศ (8) เปราะหอม (9, 10) ย่านาง (11) เกสรบัวหลวง (12) ฝาง (13) หญ้าฝรั่ง (14, 15) อบเชยเทศ (16) ขอนดอก (17) เทียนขาวเปลือก (18) เทียนดำ (19, 20) เทียนแดง (21) เทียนยาวพาณี (15) ฤทธิ์เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ บอระเพ็ด (22) ฝาง (23) เทียนแดง (24) ชิง (15) ฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ ชะเอมเทศ (15) เทียนดำ (25, 26) ฤทธิ์ทำให้หัวใจที่เต้นผิดปกติมีการเต้นได้ปกติ ได้แก่ เกสรบัวหลวง (12) โกฎสู (27) ฤทธิ์ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ได้แก่ หัวหมู (28, 29) ส่วนเครื่องยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร จะมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของกระเพาะและลำไส้ ได้แก่ กระเทียม (4 - 6) ข่าพลู (30) ลูกผักชี (5) อบเชยเทศ (31) โกฎเชียง (32, 33) โกฎกระดูก (34, 35) โกฎหัวบัว (36) กานพลู (6, 33) เทียนแดง (39) ชิง (40, 41) และลูกจันทน์ (42) ฤทธิ์ลดการหลั่งน้ำย่อยและกรด ได้แก่ โกฎกระดูก (36) ชะเอมเทศ (3, 5, 6) และลูกจันทน์ (43) ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งเมือกในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ชะเอมเทศ (3, 5, 6) และเปราะหอม (44) ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ โกฎกระดูก (37) ชะเอมเทศ (3, 5, 6, 45) เปราะหอม (44) ดีปลี (46) ฝาง (47) อบเชยเทศ (48) โกฎจุฬาลำพา (49) โกฎเชียง (50) ขอนดอก (51) เทียนขาวเปลือก (52) เทียนดำ (53) เทียนตาตุ๊กแตน (54) และเทียนสัตตบุศย์ (55) ฤทธิ์ต้านการอาเจียน ได้แก่ หัวหมู (56) กานพลู (6, 33) และชิง (5, 6, 15, 57, 58) เครื่องยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง จะมีฤทธิ์เสริมระยะเวลาหลับของยา pentobarbital ยาวนานขึ้น ได้แก่ ดอกบุนนาค (59) ฤทธิ์คลายความกังวลทำให้สงบ ได้แก่ ลูกผักชี (60) โกฎเชียง (61) จันทน์เทศ (62) กานพลู (6, 33) โกฎสู (63)

หญ้าฝรั่น (64 – 66) ลูกจันทน์ (67) และพิทูล (59) และฤทธิ์ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น ได้แก่ หญ้าฝรั่น (68 – 71) เป็นต้น

ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนเครื่องยาแต่ละชนิด แต่งานวิจัยของทั้งตำรับยาหอมยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ในปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการบูรณาการ “การวิจัยและพัฒนายาแผนโบราณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน” ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาตำรับยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักร์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการย่อย 8 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของตำรับยาแผนโบราณและสมุนไพรไทย การศึกษาฤทธิ์ของยาหอมต่อการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร และความเป็นพิษ การศึกษาผลของยาหอมและสารสกัดสมุนไพรต่ออัตราการไหลเวียนเลือดในสมอง การศึกษาฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของสมุนไพร การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์ การศึกษาหาปริมาณโลหะหนัก และฤทธิ์กลายพันธุ์ในตำรับยาแผนโบราณ การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักและฤทธิ์กลายพันธุ์ในตำรับยาแผนโบราณ และการควบคุมคุณภาพและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสารสกัดตำรับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์เพิ่มความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic pressure) ได้มาก และนานกว่าตำรับยาหอมอินทจักร์ สารสกัดทั้งสองตำรับมีผลต่อความดันขณะหัวใจคลายตัว (diastolic pressure) ได้ใกล้เคียงกัน และมีผลลดอัตราการเต้นของหัวใจเล็กน้อยในช่วงเวลา 45 - 90 นาที สารสกัดตำรับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรด และมีฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลำไส้เล็กได้มากกว่าสารสกัดตำรับยาหอมอินทจักร์ (72) สารสกัดตำรับยาหอมทั้งสองมีฤทธิ์เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองหนู โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของสมอง (73) สารสกัดตำรับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางมากกว่าสารสกัดตำรับยาหอมอินทจักร์ (74) สารสกัดตำรับยาหอมทั้งสองมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบอาศัยเซลล์โดยเพิ่มการแบ่งตัวของลิมโฟซัยท์ แต่สารสกัดตำรับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์ลดการทำงานของ natural killer cells (NK cells) ด้วย (75)



รายละเอียดของเครื่องยาในตำรับยาหอมหวโกฐเป็นดังนี้

| ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์ | วงศ์ |
|-----------------|--|--------------------------------|
| กระวาน | <i>Amomum testaceum</i> Ridl. | ZINGIBERACEAE |
| กฤษณา | <i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte | THYMELAEACEAE |
| กะดอม | <i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr. | CUCURBITACEAE |
| กะลำพัก | <i>Euphorbia antiquorum</i> L. | EUPHORBIACEAE |
| กานพลู | <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M. Perry | MYRTACEAE |
| โกฐกระดูก | <i>Saussurea lappa</i> C.B. Clarke | ASTERACEAE |
| โกฐกั๊กกรา | <i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Lagasca | ASTERACEAE |
| โกฐกำนเพชร้าว | <i>Picrothiza kurrooa</i> Royle ex Benth. | SCROPHULARIACEAE |
| โกฐเขมา | <i>Atractylodes lancea</i> (Thung.) DC. | ASTERACEAE |
| โกฐจุฬาสำพา | <i>Artemisia annua</i> L. | ASTERACEAE |
| โกฐเชียง | <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels | APIACEAE |
| โกฐพุงปลา | <i>Terminalia chebula</i> Retz. | COMBRETACEAE |
| โกฐสอ | <i>Angelica dahurica</i> Benth. | APIACEAE |
| โกฐหัวบัว | <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. cv. Chuanxiong | APIACEAE |
| ชอนดอก | <i>Mimusops elengi</i> L. | SAPOTACEAE |
| ขิง | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe | ZINGIBERACEAE |
| โค้วเครือ | <i>Aristolochia pierrei</i> Lecomte | ARISTOLOCHIACEAE |
| จันทน์แดง | <i>Dracaena loureiri</i> Gagnep. | DRACAENACEAE |
| จันทน์เทศ (ดอก) | <i>Myristica fragrans</i> Houtt. | MYRISTICACEAE |
| จันทน์เทศ (ลูก) | <i>Myristica fragrans</i> Houtt. | MYRISTICACEAE |
| จันทน์เทศ | <i>Santalum album</i> L. | SANTALACEAE |
| เจดมูลเพลิงแดง | <i>Plumbago indica</i> L. | PLUMBAGINACEAE |
| ชะลูด | <i>Alyxia reinwardtii</i> Blume | APOCYNACEAE |
| ชะเอมเทศ | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. | LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE |
| ข้าพลุ | <i>Piper sarmentosum</i> Roxb. | PIPERACEAE |
| ตีปี้ | <i>Piper chaba</i> Hunt | PIPERACEAE |
| เทียนเก็ดหยอย | <i>Plantago ovata</i> Forssk. | PLANTAGINACEAE |
| เทียนขาว | <i>Cuminum cyminum</i> L. | APIACEAE |

| ชื่อ (อ) | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อ |
|-----------------|--|------------------------------|
| เทียนข้าวเปลือก | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var <i>duce</i> Alef | APIACEAE |
| เทียนตา | <i>Nigella arvensis</i> L. | RANUNCULACEAE |
| เทียนแดง | <i>Lepidium sativum</i> L. | CRUCIFERAE |
| เทียนสาบดิน | <i>Anethum graveolens</i> L. | APIACEAE |
| เทียนขาวฟ้า | <i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague | APIACEAE |
| เทียนคันทู | <i>Pimpinella anisum</i> L. | APIACEAE |
| เทียนฟ้า | <i>Trichospora crispata</i> (L.) Miers ex Hook. f. | MENISPERMACEAE |
| เทียนขาว | <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. | NELUMBONACEAE |
| เทียนฟ้า | <i>Mesua ferrea</i> L. | GUTTIFERAE |
| เทียนหอม | <i>Kaempferia galanga</i> L. | ZINGIBERACEAE |
| เทียนสา | <i>Conandrum sativum</i> L. | APIACEAE |
| เทียนหอม | <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash ex Small | POACEAE |
| เทียน | <i>Mimusops elengi</i> L. | SAPOTACEAE |
| เทียนป้อม | <i>Phyllanthus emblica</i> L. | EUPHORBIACEAE |
| เทียน | <i>Jasminum sambac</i> (L.) Alton | OLEACEAE |
| เทียน | <i>Brucea javanica</i> (L.) Merr. | SIMARUBACEAE |
| เทียน | <i>Pinus</i> sp. | PINACEAE |
| เทียนฟ้า | <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb. | COMBRETACEAE |
| เทียนขาว | <i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet | LAURACEAE |
| เทียน | <i>Piper ribesoides</i> Wall. | PIPERACEAE |
| เทียน | <i>Dalbergia parviflora</i> Roxb. | LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE |
| เทียนฟ้า | <i>Sophora lomentosa</i> L. | LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE |
| เทียน | <i>Mammea siamensis</i> Kosterm. | GUTTIFERAE |
| เทียนคันทู | <i>Mollugo pentaphylla</i> L. | MOLLUGINACEAE |
| เทียนหัวหมู | <i>Cyperus rotundus</i> L. | CYPERACEAE |
| เทียนขี้เฒ่า | <i>Cinnamomum kourouii</i> Nees | LAURACEAE |



ตำรับยาหอมอินทจักร์

ประกอบด้วยเครื่องยา 51 ชนิด ประกอบด้วยพืชวัตถุ 46 ชนิด สัตว์วัตถุ 2 ชนิด (ดีหมีและเลือดแรด) และธาตุวัตถุ 3 ชนิด (กำยาน อำพันทอง และพิมเสน) ซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องยาในบัญชียาสามัญประจำบ้านคือ สูตรตำรับยาหอมอินทจักร์ของคลินิกอายุรเวท มูลนิธินายแพทย์อวย เกตุสิงห์ จะเพิ่มชะลูด เถามวกแดง อบเชยเทศ หญ้าฝรั่ง และพิมเสน และทดแทนผักชีลาวด้วยผักชีล้อม ดีวัวด้วยดีหมี ตัดเครื่องยาลำพันแดง ดอกจันทร์น้ ชะมดเซ็ด ดิงูเห่า และดีหมีป่า รายละเอียดของเครื่องยาในตำรับยาหอมอินทจักร์เป็นดังนี้

| ชื่อไทย | ชื่อวิทยาศาสตร์ | วงศ์ |
|--------------|--|------------------|
| กระดังงาไทย | <i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f & Thomson var. <i>odorata</i> | ANNONACEAE |
| กระวาน | <i>Amomum testaceum</i> Ridl. | ZINGIBERACEAE |
| กฤษณา | <i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte | THYMELAEACEAE |
| กะดอม | <i>Gynopetalum chinense</i> (Lour.) Merr. | CUCURBITACEAE |
| กะลำพัก | <i>Euphorbia antiquorum</i> L. | EUPHORBIACEAE |
| กานพลู | <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et L.M. Perry | MYRTACEAE |
| โกฐกระตุก | <i>Saussurea lappa</i> C.B. Clarke | ASTERACEAE |
| โกฐกั๊กกรา | <i>Anacyclus pyrethrum</i> (L.) Lagasca | ASTERACEAE |
| โกฐก้านพร้าว | <i>Picrothiza kurrooa</i> Royle ex Benth. | SCROPHULARIACEAE |
| โกฐเขมา | <i>Atractylodes lancea</i> (Thung.) DC. | ASTERACEAE |
| โกฐจุฬาลำพา | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | ASTERACEAE |
| โกฐเชียง | <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels | APIACEAE |
| โกฐน้ำเต้า | <i>Rheum palmatum</i> L. | POLYGONACEAE |
| โกฐพุงปลา | <i>Terminalia chebula</i> Retz. | COMBRETACEAE |
| โกฐสอ | <i>Angelica dahurica</i> Benth. | APIACEAE |
| ขอนดอก | <i>Mimusops elengi</i> L. | SAPOTACEAE |
| ขิง | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe | ZINGIBERACEAE |
| คำไทย | <i>Bixa orellana</i> L. | BIXACEAE |
| โค้วเครือ | <i>Aristolochia pierrei</i> Lecomte | ARISTOLOCHIACEAE |

| ชื่อไทย (ต่อ) | ชื่อวิทยาศาสตร์ | วงศ์ |
|-----------------|--|----------------------------------|
| จันทร์แดง | <i>Dracaena loureiri</i> Gagnep. | DRACAENACEAE |
| จันทร์เทศ (ลูก) | <i>Myristica fragrans</i> Houtt. | MYRISTICACEAE |
| จันทร์เทศ | <i>Santalum album</i> L. | SANTALACEAE |
| จำปา | <i>Michelia champaca</i> L. | MAGNOLIACEAE |
| เจตมูลเพลิง | <i>Plumbago indica</i> L. | PLUMBAGINACEAE |
| ชะลูด | <i>Alyxia reinwardtii</i> Blume | APOCYNACEAE |
| ข้าวปลู | <i>Piper sarmentosum</i> Roxb. | PIPERACEAE |
| ตีปตี | <i>Piper chaba</i> Hunt | PIPERACEAE |
| เทียนขาว | <i>Cuminum cyminum</i> L. | APIACEAE |
| เทียนข้าวเปลือก | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. var <i>dulce</i> Alef | APIACEAE |
| เทียนดำ | <i>Nigella sativa</i> L. | RANUNCULACEAE |
| เทียนแดง | <i>Lepidium sativum</i> L. | CRUCIFERAE |
| เทียนยาวพาดณี | <i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague | APIACEAE |
| บอระเพ็ด | <i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson | MENISPERMACEAE |
| บุนนาค | <i>Mesua ferrea</i> L. | GUTTIFERAE |
| ผักชีล้อม | <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. | APIACEAE |
| ฝาง | <i>Caesalpinia sappan</i> L. | LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE |
| พิกุล | <i>Mimusops elengi</i> L. | SAPOTACEAE |
| มวกขาว | <i>Urceola minutiflora</i> (Pierre) D.J. Middleton | APOCYNACEAE |
| มวกแดง | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| มะดี | <i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton | OLEACEAE |
| ย่านาง | <i>Tiliacora triandra</i> (Colebr.) Diels | MENISPERMACEAE |
| สมุลแว้ง | <i>Cinnamomum bejolghota</i> (Buch.-Ham.) Sweet | LAURACEAE |
| สะค้าน | <i>Piper nibesoides</i> Wall. | PIPERACEAE |
| สารภี | <i>Mammea siamensis</i> Kosterm. | GUTTIFERAE |
| หญ้าฝรั่น | <i>Crocus sativus</i> L. | IRIDACEAE |
| อบเชยเทศ | <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl | LAURACEAE |

สำหรับรายละเอียดข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรแต่ละชนิดในตำรับยาหอมหวโกรฐและยาหอมอินทจักร์ สามารถติดตามอ่านได้ในจุลสารฯ ฉบับต่อไป

เอกสารอ้างอิง ติดต่อได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร